

Alteri (Femina forte) Corpus magnitudine T. pulsatorii. Caput cornutum, leve, oblongo subtrapezium, luteum. Antennae vix thorace longiores. Maxilla cornuta, laevae, nigrae, subulatae, subarcuatae, porrectae, longitudine antennarum. Abdomen oblongum, subcylindricum, albicans.

Alterum (Sexu tantum diversum, Rolander) simile praecedenti, sed absque maxillis magnis porrectis. Caput suborbiculatum, flavescens. Maxilla brevissima. Antennae filiformes, corpore dimidio breviores. Abdomen ovatum, albidum.

- pulsatorium. 2. T. abdomine oblongo, ore rubro, oculis luteis.
Fn. svec. 1168.
Derb. theol. 119.
Bradl. nat. t. 27. f. 3.
Raj. inf. 8.
Act. angl. n. 270. p. 231. & n. 291. p. 1586 & n. 245. p. 376.
Roland act. Stockb. 1754. p. 152.
Habitat in Europa & America, frequens in dumis, in visum vestibus, Herbariis, Insectorum muscis. Femina horologii instar pulsatoria in ligneis festucis.
- fatidicum. 3. T. abdomine ovato, ore pallido, oculis fulcis.
Frisch. inf. 11. p. 2. t. 10.
Habitat in Europa australiore, nobis primum visum in plantis succis a Læstingio transmissis.
Simile praecedenti, sed duple majus.

233. PEDICULUS. *Pedes VI, ambulatorii.*
Oculi II.
Os aculco exferendo.
Antennae longitudine thoracis.
Abdomen depressum, sublobatum.

- Humanus. 1. P. humanus. *Fn. svec. 1153.*
Mouff. inf. 259.
Red. exp. t. 18.
Swamm. quart. t. 7.
bibl. t. 1. f. 3-6.
Habitat in capite & vestimentis humanis.
- Alb. aran. t. 42.*
Bonan. micr. f. 55.
Joblot. micr. t. pp. 1. t. 1.
Baker. micr. t. 13. f. 4.
2. P.

Pediculi Manualium Aviarumque multo plures etiamnum non observati, minus descripti, multo minus differentia determinati existunt.

- Pubis. 2. P. pubis. *Fn. svec. 1154.*
Mouff. inf. 200.
Raj. inf. 8.
Schenk. obs. 676.
Habitat in Hominis immundi pube, rarius & superciliis.
Red. exp. t. 19. f. 1.
Pet. gaz. t. 67. f. 9.
- ricinoides. 3. P. abdomine orbiculato linea alba, scutello triobco, rostro albo.
Habitat in America, pedes obamoulantium intrans, sanguinem hauriens, in iis ova aepovens, ulcera cacothetica causans. Rolander.
Acarus esset, nisi pedes rufescentes tantum 6. Rostrum longum cylindricum subtus hamolis. Corpus rufescentis.
- Vespertilionis. 4. P. thorace angularo-cruciato, pedibus unguatis, corpore longioribus.
Frisch. inf. 7. t. 7.
Habitat in Vespertione murino.
Animal insuetae structure, Acaro aut Phalangio simile, in plano non procedere valet.
- Suis. 5. P. Suis scrofae.
Habitat in Suis B.
- Porcelli. 6. P. Muris Porcelli.
Habitat in Mure Porcello.
- Cameli. 7. P. Cameli. †
Red. exp. t. 22.
Habitat in Camelo Dromedario, Baetiano.
- Cervi. 8. P. Cervi.
Frisch. inf. 12. p. 15 t. 5.
Habitat in Cervo Elapho, Dama, Capreolo.
Red. exp. t. 5.
- Ovis. 9. P. Ovis Arietis.
Red. exp. t. 22. f. 1?
Habitat in Ovibus.
- Bovis. 10. P. Bovis Tauri, abdomine lineis transversis octo ferrugineis. *Fn. svec. 1155.*
Habitat in Bobus.
- Vituli. 11. P. Bovis Tauri, abdomine plumbeo. *Fn. svec. 1156.*
Habitat in Bobus cum praecedenti.

- Equi. 12. P. Equi Caballi.
Habitat in Equis.
- Afini. 13. P. Equi Afini. †
Red. exper. t. 22. f. 1.
Habitat in Afinis.
- Tinnunculi. 14. P. Falconis Tinnunculi. *Fn. suec. 1157.*
Red. exp. t. 13.
Frisch. inf. 11. p. 24. t. 24.
Habitat in Falconibus Tinnunculis, Milvis.
Conferantur aliæ species in Falconibus. Red. exp. t. 1.
- Corvi. 15. P. Corvi Coracis. *Fn. suec. 1158.*
Red. exp. t. 16. f. 2.
Habitat in Corvis.
- infausti. 16. P. Corvi infausti.
Fn. suec. 1159. Pediculus Picæ lapponicæ.
Habitat in Corvo infausto.
- Picæ. 17. P. Corvi Picæ. †
Red. exp. t. 5.
Habitat in Corvo Pica.
- Cygni. 18. P. Anatis Cygni. †
Red. exper. t. 8.
Habitat in Cygno.
Conferatur Red. exp. t. 9. f. 3.
- Anseris. 19. P. Anatis Anseris.
Red. exper. t. 10.
Habitat in Anseribus feris & mansuetis.
- moschata. 20. P. Anatis moschata. †
Red. exper. t. 9. f. 1.
Habitat in Anate moschata.
- Querquedula. 21. P. Anatis Querquedula. †
Red. exper. t. 12.
Habitat in Querquedula.
- Sternæ. 22. P. Sternæ Hirundinis. *Fn. suec. 1162.*
Red. exper. t. 9. f. 2.
Habitat in Sternis, Laris.

- Platæ. 23. P. Platæ Leucorodiæ. †
Red. exper. t. 4.
Habitat in Leucorodiis.
- Ardeæ. 24. P. Ardeæ cineræ. †
Red. exper. t. 6.
Habitat in Ardeis.
- Gruis. 25. P. Ardeæ Gruis. *Fn. suec. 1162. †*
Red. exper. t. 3.
Habitat in Gruibus.
- Ciconiæ. 26. P. Ardeæ Ciconiæ.
Frisch. inf. 8. p. 9. t. 6.
Habitat in Ciconiis.
- Charadrii. 27. P. Charadrii Pluvialis. †
Red. exper. t. 9.
Habitat in Pluvialibus.
- Fulicæ. 28. P. Fulicæ atræ. †
Red. exper. t. 4.
Habitat in Fulicis.
- Recurvirostræ. 29. P. Recurvirostræ Avosettæ. *It. æl. 90. Fann. suec. 1163.*
Habitat in Recurvirostris.
- Hæmatopi. 30. P. Hæmatopi Ostralegi. *Fn. suec. 1164.*
Habitat in Hæmatopis.
- Pavonis. 31. P. Pavonis cristati. †
Frisch. inf. 12. t. 3. f. 6. *Red. exper. t. 15.*
Habitat in Pavonibus.
- Meleagridis. 32. P. Meleagridis Gallo-pavonis. *Fn. suec. 1160.*
Frisch. inf. 8. t. 4. *Red. exper. t. 22²*
Habitat in Gallo-pavonibus.
- Gallinæ. 33. P. Phasiani Galli thorace capiteque utrinque mucronato.
Fn. suec. 1166.
Habitat in Gallinis domesticis.
Expellitur Pipere.

Caponis, 34. P. Phasiani Galli alter. *Fn. suec.* 1165.
Frisch. inf. 11. t. 24. *Red. exper.* t. 16. f. 1.
Habitat in Gallinis domesticis.

Tetraonis, 35. P. Tetraonis Tetricis.
Red. exper. t. 14. Pulex pavonis?
Habitat in Tetraonibus.

Lagopi, 36. P. Tetraonis Lagopi. *Fn. suec.* 1167.
Habitat in Lagopis.

Columbae, 37. P. Columbæ Oenatis. †
Red. exper. t. 2. f. 1.
Habitat in Columbis.

Pari, 38. P. Pari majoris, cauda quadrifeta. †
Frisch. inf. 8. p. 9. t. 1. f. 5.
Habitat in Paris.

Apis, 39. P. Apis. †
Frisch. inf. 8. t. 16.
Habitat in Apibus ad squamulam halterum.

234. PULEX. *Pedes VI, saltatorii,*
Oculi II.
Os rostro inflexo.
Abdomen compressum.

irritans, 1. P. proboscide corpore brevior.
Fn. suec. 1171. Pulex. *Joblot. micr.* 1. pp. 1. t. 3.
Raj. inf. 7. *Frisch. inf.* 11. p. 8.
Alb. aran. t. 41. *Vallijn. oper.* 1. t. 25. f. 1.
Bonon. micr. f. 56. *Leuwenb. epist.* 26. f. 1-20.
Anon. angl. p. 204. f. 12. *Raf. inf.* 2. musc. t. 2, 3, 4.
Hook. microgr. *Baker. micr.* t. 13. f. 8.
Habitat ubique in Europa, Leporibus imprimis molesta;
in America. Kalm.
Larva apoda, cauda bifurca, net. Pupa pedata, immo-
bilis. Mas sub semina jungitur, affinis coleopratis.

pene- 2 P. proboscide corporis longitudine.
trans. *Maregr. bras.* 249. Tunga.
Sloan. jam. 2. p. 191. *introd.* 125.

Catesb.

Catesb. car. 3. p. 10. t. 10. f. 3. Pulex cutem pene-
trans.

Habitat in America: Pedes hominum intrans, ova depo-
nens, unde cacochthes, saepe mors.

Corpus fusco rufescens, compressum. Abdomen subtus al-
bidum. Famelicus saltat, precedenti simillimus. Ro-
lander.

235. ACARUS. *Pedes VIII.*
Oculi II, ad latera capitis.
Tentacula duo, articulata, pedi-
formia.

elephan- 1. A. orbicularis depressus: macula baseos ovata.
tinus. *Habitat in India.*
Magnitudo seminis Lupini albi, depressus, lividus mar-
gine crasso, subtus utrinque 3 sulcis. Macula baseos
nigra, ovata, trifida.

egyptius, 2. A. obovatus fuscus margine albo *M. L. U.*
Habitat in Oriente.

Reduvius, 3. A. obovatus planus macula baseos obovata.
Fn. suec. 1192. *It. oland.* 62. 126.
Raj. inf. 9.
Habitat in Bobus, Canibus, sylvis.

america- 4. A. obovatus rubicundus, scutello geniculisque pedum
nus. albidis.
Kalm. act. Stockh. 1754.
Habitat in America.

sanguisu- 5. A. abdomine postice crenato, scutello ovato subfulvo,
gus. rostro tripartito.
Habitat in America. Rolander.
Pedes antichi ad exortum spinis brevibus. Sanguinem in
tibiis obambulantium haurit vix extrahendus.

Ricinus, 6. A. globofo-ovatus macula baseos rotunda, antennis
clavatis.
Fn. suec. 1193. *Raj. inf.* 10.
Aldr. inf. 559. *Frisch. inf.* 5. t. 19.
Habitat in Bobus, Canibus.